



LE PRINTEMPS ARRIVE!

Et avec le printemps, le temps vient où les roses ont besoin d'un peu d'aide pour pouvoir nous gâter avec leur floraison parfaite.



ROSES GRIMPANTES: suivant les caractéristiques tailler prudemment ou résolument.



Couper généreusement les pousses sèches ou qui ont gelé.



Magnifique floraison des roses à l'entrée.



ROSIER: avant la taille



Taille au niveau de l'œil /du bourgeon. La croissance est dirigée par la taille.



Après la taille.

Le rosier est le buisson du jardin donnant le plus de fleurs. Celles-ci se développent sur les pousses d'une année – très différemment du forsythia par exemple ou d'autres arbustes à fleurs qui ont formé leurs fleurs l'année auparavant. C'est pourquoi les roses supportent des tailles sévères à la fin de l'hiver.

Les soins à donner aux roses débutent à la fin de l'hiver déjà par l'enlèvement des nattes contre le gel ou des branches de sapin. Les meilleures conditions pour la taille annuelle se situent au moment où des forts gels ne sont plus à attendre, mais avant que les bourgeons ne se développent. En automne, il ne faut que couper les restes de fleurs fanées, raccourcir quelque peu les longues pousses trop denses. Avant la taille de la fin de l'hiver, il est nécessaire de débarrasser le terreau afin de libérer le rosier, ce qui doit être fait prudemment pour ne pas abîmer les pousses. Ce terreau servira de même à améliorer le sol des platebandes, il sera réparti sur une étendue suffisante. L'endroit de la greffe doit se trouver dans le sol. Lors de l'enlèvement du terreau, la greffe ne doit pas être mise à nu, ce qui d'ailleurs doit aussi être le cas lors de la plantation également. Les rosiers sont en principe greffés sur des rosiers sauvages. Cela a lieu en été par l'application d'un bourgeon sur une jeune rose sauvage. La base des rosiers sauvages favorise une forte croissance et ainsi fortifie la résistance au gel. Lors de la plantation, les jeunes rosiers greffés doivent être placés en terre de manière à ce que l'endroit de la greffe soit à une profondeur de 5 à 10 cm. D'autres ligneux greffés, tels que les arbres fruitiers, les pieds de vigne, les cerisiers du Japon et autres buissons analogues n'en ont pas besoin; la greffe de ceux-ci doit être au-dessus du sol, car ils sont suffisamment résistants au gel. Il peut arriver que les pousses des rosiers gèlent jusqu'au sol. La plantation profonde empêche un gel total. Tant que les pousses sont encore en bonne santé et capables de bourgeonner peu au-dessus de la greffe, le rosier rajeunira de nouveau. En été, il sera de nouveau en pleine floraison.

Taille sévère = croissance fournie

Suivant le type de rose et la forme de croissance, la taille sera résolue ou prudente. Les rosiers faibles

seront sévèrement taillés, alors que les rosiers forts nécessitent une intervention modérée. Ils ont besoin d'une taille sévère uniquement si le gel les a sérieusement endommagés. Sinon, il est suffisant d'éliminer les pousses faibles et de raccourcir les pousses fortes. En ce qui concerne les rosiers de platebandes (roses greffées, floribunda, hybrides T) ce sont les yeux ou les bourgeons qui donnent les mesures. Ils sont nettement reconnaissables à leur position sur les pousses. Au printemps, chaque bourgeon donnera une nouvelle pousse. Moins il restera de bourgeons, plus la croissance des pousses sera forte. La croissance est guidée par la taille Plus la taille entreprise est sévère, plus la croissance sera forte. Normalement, il faut laisser 5 à 10 bourgeons. Les pousses seront coupées chaque fois au-dessus de ce nombre. Mais il n'est pas nécessaire de compter les bourgeons. En règle générale, une taille des pousses est favorable à mi-longueur environ. Chaque bourgeon terminal devrait être orienté vers l'extérieur. Il fournira la pousse la plus forte. Dans le cas des rosiers buissons et grimpants, qui de toute façon poussent vigoureusement, il ne faut qu'éliminer les pousses faibles et rabattre les pousses trop longues. Les rosiers ne nécessiteront également une taille sévère que si des dégâts importants dus au gel sont bien visibles après un hiver très rude (reconnaissable aux pousses nettement noires).

Rosiers couvre-sol

La plupart des rosiers couvre-sol prennent une place particulière. Ils ne sont pas produits dans les pépinières par le greffage sur des rosiers sauvages, mais par bouturage. La plupart de variétés, contrairement aux rosiers de platebandes, ne forment pas de pousses dressées, mais produisent de longues tiges rampantes. A la fin de l'hiver, la taille se limite au raccourcissement des pointes de pousses gelées, à la coupe des restes de fleur fanées et à l'élimination des pousses faibles et malades.

Rosiers demi-tige et rosiers sauvages

Tous les rosiers tige sont des rosiers greffés ou également des rosiers grimpants qui sont greffés sur des tiges de rosiers sauvages; ils ont besoin des mêmes tailles que les rosiers de platebandes. Après avoir en-

levé la protection hivernale, il est nécessaire de tailler toutes les pousses gelées jusqu'au bois vert sain. D'autre part les pousses faibles sont enlevées et les longues pousses saines seront rabattues comme les roses de platebandes à environ 5 yeux ou alors raccourcies à environ la moitié de la longueur.

Les rosiers sauvages, tout différemment des roses greffées, ne doivent pas être taillés „à l'œil“. Ils seront taillés de la même manière que tout autre buisson ornemental. Normalement, une taille d'éclaircissement occasionnelle est suffisante, lors de laquelle quelques vieilles branches trop serrées seront coupées au niveau du sol. Après avoir enlevé environ 2 à 3 vieilles pousses, les buissons paraîtront aérés et légers, puis ils se rajeuniront en produisant des nouvelles pousses à partir de la souche. En outre, lors de la taille d'hiver, il est possible de raccourcir les longues pousses des rosiers sauvages lorsqu'elles dérangent. La taille est aussi l'occasion d'enlever tous les vieux cynorrhodons et les fleurs desséchées également. Ceci est aussi valable pour les roses sélectionnées, les roses grimpants ou buisson.

Sauvageons

Lors de la taille déjà ou plus tard dans le courant de l'été, prêtez attention en permanence aux sauvageons poussant en dessous de la greffe. Ils se différencient nettement par leur forte croissance, une autre couleur et des épines différentes de celles des pousses sélectionnées. En été, on les reconnaît sans se tromper à leurs petites feuilles. Les sauvageons qui ont été oubliés ou n'ont pas été découverts se transforment rapidement en buissons bien fournis. Finalement, ils envahissent la partie sélectionnée du rosier lorsqu'ils peuvent pousser librement. Le mieux est d'enlever de telles pousses en les coupant le plus bas possible à l'endroit de départ. Pour cela, il est nécessaire de dégager les racines, car tout reste produirait de nouveaux sauvageons robustes.