



ARRIVA LA PRIMAVERA!

E con la primavera giunge anche il momento di dare alle rose un aiuto affinché ci regalino una fioritura perfetta!



ROSA RAMPICANTE: secondo la tipologia, richiede una potatura energica o prudente.



I rami gelati o secchi vanno tagliati generosamente.



La magnifica fioritura di rose presso l'uscio di casa.

Le ibridi di tea sono sicuramente gli arbusti da giardino a regalarci la fioritura più ricca. Questo tipo di rosa fiorisce sui rami freschi formati durante l'anno in corso – diversamente, ad esempio, dalle forszie o altri arbusti fioriti, che sviluppano i fiori l'anno prima sui vecchi rami. Per questo motivo queste rose sopportano potature anche energiche eseguite a tardo inverno.

La cura delle rose inizia a inverno inoltrato eliminando le protezioni antigelive o i rami d'abete. Superato il periodo di freddo più intenso, ma prima che inizi la gemmazione, è il periodo migliore per procedere alla potatura annuale. In autunno ci si era limitati a pulire gli arbusti dai fiori appassiti e ad accorciare leggermente e riunire i rami troppo sviluppati. Prima della potatura invernale occorre rimuovere la terra e liberare gli arbusti, procedendo con cautela per non danneggiare gli eventuali getti. Utilizzeremo questa terra per migliorare il terreno dell'aiuola, distribuendola sul suolo. Il punto d'innesto deve rimanere sotto il suolo e non dev'essere dissotterrato durante la pulizia – un accorgimento da osservare già in occasione della piantagione. Le ibridi di tea vengono generalmente innestate su rose selvatiche. Questa operazione è effettuata d'estate, inserendo una gemma sopra una giovane rosa selvatica. In questo modo si ottiene una nuova pianta con un piede vigoroso, una vegetazione rigogliosa e una migliore resistenza al gelo. Per le giovani rose ibride di tea il punto d'innesto si trova 5-10 cm sotto la superficie del terreno. Nel caso di altri arbusti innestati, come alberi fruttiferi, viti, ciliegi ornamentali e simili, invece, l'innesto è aereo, e il punto d'innesto è situato ben al di sopra del livello del terreno. Queste varietà sono comunque sufficientemente resistenti al gelo. Nel caso delle rose ibride di tea può accadere che i getti gelino fino al livello del terreno. La piantagione profonda impedisce che gelino completamente. Fin tanto che i getti appena sopra il punto d'innesto sono sani e in grado di germogliare, le rose ringiovaniranno, e in estate saranno completamente rifiorite.

Potatura energica per una vegetazione folta

Secondo il tipo di rosa e di vegetazione, la potatura sarà più vigorosa o più leggera. I rami deboli sono sottoposti ad una potatura drastica, mentre sarà sufficiente intervenire con moderazione sui rami più robusti. Occorrerà una potatura più energica soltanto se molto danneggiati dal gelo; altrimenti, basterà ripulirli dai rami più deboli riducendo nel contempo i getti più vigorosi. Come riferimento, per le rose da aiuola (ibridi di tea, floribunde) si prendano i cimoli o le gemme, ben riconoscibili ai getti. In primavera ogni germoglio porterà un nuovo getto. Minore è il numero dei rami conservati, più rigogliosa sarà la germogliazione. La potatura consente di controllare la vegetazione. Più essa è energica, più forte sarà la germogliazione. Generalmente si conservano dai 5 ai 10 germogli – non è, tuttavia, necessario contare le gemme – tagliando il ramo appena sopra la gemma. Di regola generale l'altezza dell'arbusto è dimezzata, badando a che le gemme più alte siano rivolte verso l'esterno, poiché produrranno i germogli più forti. Nel caso delle rose arbustive e rampicanti, che hanno comunque una germogliazione vigorosa, è sufficiente eliminare i rami deboli ed accorciare quelli troppo lunghi. Soltanto dopo un inverno particolarmente rigido, in presenza di evidenti danni da gelo (riconoscibili dai rami anneriti), si procederà ad una potatura energica anche di queste rose.

Rose tapezzanti

La maggior parte delle rose tapezzanti merita un'attenzione particolare, poiché non vengono propagate per innesto su rose antiche, bensì per talea. La maggior parte delle varietà non forma, diversamente dalle rose da aiuola, dei rami verticali, ma lunghe verghe striscianti. La potatura a inverno inoltrato si limita ad accorciare i rametti gelati, ripulire dalle inflorescenze avvizzite ed eliminare i rami deboli e malati.

Rosai e rose selvatiche

Tutte le rose alberello sono ibride di tea o rosai rampicanti inoculati su rametti di rosa selvatica. La potatura è la stessa riservata alle rose striscianti. Dopo aver rimosso la protezione invernale, si recideranno laddove necessario le cime dei rametti gelati fino alla parte verde, sana. Per il resto, basterà eliminare i rami deboli ed accorciare quelli troppo lunghi a ca. 5 gemme, come per le rose tapezzanti, o a ridurre l'arbusto all'incirca della metà.

Contrariamente alle rose ibride di tea, le rose selvatiche non vanno potate alla gemma, ma come altri arbusti ornamentali. Generalmente basta una sfoltitura occasionale, recidendo a raso terra alcuni vecchi rami fitti. Dopo aver rimosso due-tre vecchi rami, gli arbusti appaiono già più leggeri e aerei. Ringiovaniranno germogliando dal rizoma. Inoltre, la potatura invernale consente di accorciare i getti più lunghi delle rose selvatiche che dovessero disturbare. Durante la potatura si avrà cura di rimuovere anche i vecchi cinorodi o le parti sfiorite. Ciò vale anche per le ibride di tea, le rose rampicanti e le rose a cespuglio.

Eliminazione dei polloni

Già al momento della potatura e poi durante l'estate si tengano d'occhio i polloni che spuntano dal portainnesto, che si differenziano visibilmente dai rametti nobili per la crescita più vigorosa, il colore differente e il tipo di spina diversa. In estate sono inconfondibilmente riconoscibili dalle piccole foglie. I polloni non recisi si sviluppano in breve tempo in vigorosi arbusti, e se lasciati crescere indisturbati finiscono col soffocare la parte nobile della rosa. La cosa migliore da fare è recidere i polloni il più profondamente possibile, direttamente nel punto di inserzione – si provvederà a mettere a nudo la radice – poiché i residui in grado di germogliare produrranno in breve tempo altri, vigorosi polloni.



ROSA IBRIDA DI TEA: Prima della potatura



Potatura sopra la gemma. Il taglio consente di controllare la crescita.



Nopo la potatura.